

Seminaro

## **SKIAUTERUČIŲ AUGINIMAS IR DAUGINIMAS**

anotacija

Skiauteručio gentyje daugiamečiai žoliniai, medėjančiais stiebais augalai, paplitę Meksikoje, Gvatemaloje. Užauga priklausomai nuo rūšies – 30 cm ar 300 (500) cm aukščio. Stiebai statūs, svyrantys arba laipiojantys. Lapai plaukuoti, dantyti. Žiedai pavieniai, lapų pažastyse, rožiniai, raudoni, balti bei purpuriniai. Vainikėlis netaisyklingas; jo vamzdelis išsipūtęs, atbraila trumpa, dvilūpė, su dviskilte viršutine lūpa ir triskilte apatine. Kai kurioms rūšims būdingi gumbai-kaudeksai.

Rūšiniai skiauteručiai dauginami sėklomis, veisliniai – tik vegetatyviai. Sėklos dažniausiai sėjamos pavasarį, tačiau norint ankščiau turėti žydinčių augalų jas būtina sėti vėlai rudenį (lapkričio mėn.). Esant 18-20° C sėklos sudygsta per 1-2 savaites, kartais jos sudygsta tik per mėnesį. Daigai pikuojami pasirodžius pirmiesiems lapeliams. Į pastovią vietą sodinami ar sustatomi vazonuose jiems išaugus iki 20-30 cm aukščio. Ūgliams lipti būtina įtaisyti atramas.